



# FICHE PRATIQUE DÉSHÉRBAGE MÉCANIQUE - POIS/FÉVEROLE

Le pois fourrager et la féverole sont des légumineuses et des cultures d'hiver. Elles diversifient la rotation et participe à l'autonomie fourragère. La féverole particulièrement s'adapte bien au désherbage mécanique

## ITINÉRAIRES TECHNIQUES D'IMPLANTATION DE LA CULTURE\*

**POIS** Labour + semis combiné  
Inter rang de 35 cm

**FÉVEROLE** Labour + semis combiné  
Inter rang de 30 cm

\* Exemples de stratégies issus d'enquêtes réalisées par le réseau cuma en 2011

## INTERVENTIONS DU SEMIS À LA RÉCOLTE\*



Stade de la culture

2 FEUILLES    6 FEUILLES    COUVERTURE DU SOL

POIS	NOVEMBRE	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT
	Semis		Bineuse		Intervention non conseillée dès formation des vrilles		Récolte	
FÉVEROLE	NOVEMBRE	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT
	Semis	Bineuse et herse étrille		Bineuse et herse étrille		Eviter implantation sur parcelle avec chardons et rumex		Récolte

**Légende**  
 ↑ Semis    ↑ Récolte    ↑ Interventions mécaniques

\* Exemples de stratégies issus des enquêtes réalisées par le réseau cuma en 2011


## TÉMOIGNAGE AGRICULTEUR

### Binage de la féverole

Au Gaec du Pré long (22), Patrice Deriac positionne la féverole en tête d'assolement. Cette culture, semée avec un écartement de 30 cm et une profondeur de 6 cm, est binée en mars.

"Il faut être attentif car les plants s'arrachent facilement"

## ROTATIONS\*



\* Exemples de rotations issus des enquêtes réalisées par le réseau cuma en 2011

Avec le soutien de

